

8ème année n° 12

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

AVEYRON, AUDE, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72 - C. C. P. 52 38 57

1^o et 2^o Editions n° 73^o Edition n° 4

9 mai 1960

INFORMATIONSMOUCHE DE LA CERISE

Zones I, II, III

Le vol de la Mouche de la cerise a commencé dans le département du Gard.

Les traitements au D.D.T. sont à exécuter du 13 au 15 mai sur les variétés devant être récoltées à la fin du mois.

Les traitements au Rogor (Dinéthoate) sont à exécuter du 19 au 22 mai sur les mêmes variétés. Un abaissement de température, des vents violents, ralentiront l'activité de l'insecte.

CARPOCAPSE

Zones I, II, III

Dans de très nombreuses situations, la température crépusculaire est très supérieure au seuil critique. Cependant aucune éclosion ni capture n'a encore permis d'observer l'insecte, qui, s'il l'avait été, ne nécessiterait l'exécution d'un traitement qu'à partir du 22 mai. Les arboriculteurs n'ont donc aucune raison de traiter spécialement contre le Carpocapse, d'autant plus que la lutte contre les insectes suceurs à l'aide du parathion, d'oléoparathion ou de malathion, partout où elle est nécessaire, aurait une efficacité contre le "ver des pommes".

L'Inspecteur ;

P. BERVILLE

Le Contrôleur,

L. L. TROUILLON

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES
Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Montpellier le 6 mai 1960

NOTE n° 4EUDENIS

Le vol de papillons de première génération d'eudénis est pour le moment peu important.

Toutefois il a été visible à CAUX, VALROS (Hérault).

Le traitement insecticide qui s'y rapporte est à effectuer dès réception de cet avis.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles,

G. BERNON

7316